



BONNES PRATIQUES AGRICOLES

Riziculture irriguée



1. Respect du calendrier cultural :

Préparation du sol

Date de semis

Culture	Riz bas-fond											
	X1648, X265, X1649, IR64, MXK, IR38, Fivary (85,32)											
Variétés	Intermédiaire											
	IR64, MXK, IR38, Fivary (85,32)											
Mois	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	June	July	August	September
Jour	01-10 11-20 21-31 02-10 11-20 21-31	01-10 11-20 21-31 02-10 11-20 21-31	01-10 11-20 21-31 02-10 11-20 21-31	01-10 11-20 21-31 02-10 11-20 21-31	01-10 11-20 21-31 02-10 11-20 21-31	01-10 11-20 21-31 02-10 11-20 21-31	01-10 11-20 21-31 02-10 11-20 21-31	01-10 11-20 21-31 02-10 11-20 21-31	01-10 11-20 21-31 02-10 11-20 21-31	01-10 11-20 21-31 02-10 11-20 21-31	01-10 11-20 21-31 02-10 11-20 21-31	01-10 11-20 21-31 02-10 11-20 21-31

2. Bonne préparation du sol :

Labour de fin de cycle de préférence

Bon planage

Renforcement des diguettes



3. Utilisation des SEMENCES certifiées et des variétés améliorées :

Variété adaptée au milieu

Semence pure et saine




4. Repiquage de jeune plant (3-4 feuilles):

Repiquage en ligne

Écartement 20 cm x 20 cm ou 25 cm

x 20 cm à raison de

2 à 3 plants /touffe



5. Application adéquate de fertilisation organique combinée à la fertilisation minérale :

Application du fumier/ compost ($\geq 5T/ha$) + engrais minéraux (100 - 200kg/ha)

+ urée 46% (65-100 kg /ha)

6. Sarclage à temps:

2 à 3 fois avec sarcluse mécanisée suivie d'un sarclage manuel



7. Gestion de l'eau :

Présence de canaux d'irrigation et de drainage

Adapter le niveau d'eau selon la taille de la

plantule et son stade de développement

Respect du temps de mise à sec



8. Récolte à temps :

80% de la parcelle vire au jaune

Utilisation de matériels : batteuse, vanneuse et aire de séchage/battage pour minimiser les pertes à la récolte

Pour faire face aux changements climatiques (retard pluie), il est recommandé d'utiliser la variété à cycle court X915 (3,5 à 5t/ha), 100-110 jours et permet la mise en place à temps des cultures de contre-saison sur la rizière !